07 | 4

Tinta de Santarem


0MTP1115



Vass2R03s126-130 0Mtp1115 2 Post Nac Não Não Vintor de Contratamento

FH


2 kg 3 s 126-120 Timba de Santarens











ANNEE 1992

NOM Tinta de Santarem EMPLACEMENT 2 R3 1126.130

۸	1	۸		b		
	и	L	U	ą,	2	

Souche	Nbre	Débou début	rrement mi/déb	grap	Ferti- lité	début	mi/f	fin	début	raison mi/v	fin	Maturité		
i	4	23.3	26.34	5	13	21.5	25,5	29.5	30.7	5,8	10,8	7.9		
2	4	23.3	30,31	5			+3			+2		+4		
3			30,31	5							*	: L - M (C)		
4	3	26,3	30.3	3	Pour :		Mil							
5	3	30.3	2.4	1 4	Baie:									
					G			21	obov-cy			-0-		
	16	30.3.	99		Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S- m - ar - fox - herb									
		£10	-		Pépins	V -1								
		,			Port :				igueur	;				

ANNEE 1993

NOM Tinta de Santarem EMPLACEMENT 2 R31-126,130 ni (4.5.A13)

ni

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo:	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité	
1 2	4	1-4	5,41	76	. 15	20.6	5-6	19.6	£8	9,8	16,8	13.9	
3			54.									: L - M -C	
4	4				Pour :								
5	4	1-H	5.4.	6	Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus								
	1	le 5.4	93		Couleur Saveur Pépins	: s -	m - a	r - fe			- 00	oloré	
		+(1)	6		Port :	engi		<u>v</u> :	igueur	: 3			

ANNEE: 1896

MOM tinta de Santarena EMPLACEMENT L R3 A 126.130

ni.				,								
ouche	Nbre yeux	Débourrement Ubre début mi/déb grap			Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturit é
1 2 3 4 5	6 6 4	18.3 11.3 11.3 183 183	25.3.	66314	Couleur Saveur Popins Fort:	: G - G - G - G - G - G - G - G - G - G	M - P Mil. J - M - Sph-el. Gr-Rs-1 m - a.	Dim 1: - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy	Compa yl-fus : inc	cité:	: L - M -C

Nº d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Garden de Fastoan Tinta de Santarema (A) BOURGEONNEMENT 2 Rg 3 s 126-130 s - 3

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duyeteux 189 cotonneux 190) - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages brensées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280) - sams villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou guivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 1ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Hervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villesité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 89

Toute de Sentarem 2 R 3 s. 126, 130 A 13 (4.5 A 13) 2 R 3 s. 126, 130 A 13 Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8)- vert 9.

: dos coloré 1 à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4 base
subcontinues 5 - subcontinues 6, 52 - vrille

: coloré () vert 8 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodita 8 - Femelle 9.

Calvo 89

Finta de Santarens 2 Rg 3 s-126-130-8.2

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 2/2 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiel Tement - totalement.

Calvo 89

No d'ordre : Désignation: Tinta de Santarem mule 4-5 A 13 Emplacement : 2 R30-126-130 0,1 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions 16 x 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) Compacte 6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9) 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5. BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 17 x17). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9) 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7 29 - A jus incolore 1 - coloré (2) 33 - A peau fine (3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Aved pépins 8 - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen(2)- court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge (5)- irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Cálvo 91

Tinta de Santarens 2 Rg 3 s - 126 - 130 A . 2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9). Surface

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvos9

N° d'ordre: Désignation: Tinta de Santarem Emplacement: 2 R 3 1126.130

: 1 -2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - (6) Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 70 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 63 - 64 - 65 - 56 - 57 - 58- 59 : 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües